

Vážení čtenáři, na stránkách Praktického lékařství se v každém čísle setkáváte s autodidaktickým testem, který ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete na jeho konci. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Pokračovací formule se podávají:

- a) od 3. měsíce
- b) od 4. měsíce
- c) od 5. měsíce
- d) od 6. měsíce

2 Jako rizikové z rozvoje alergie je označováno dítě:

- a) které má alergického jednoho rodiče nebo sourozence
- b) má alergického prarodiče
- c) v rodině se objevila epilepsie
- d) u dítěte se objevil v útlém věku ekzém

3 Jaká je limitní velikost tukových částic v parenterální výživě dle USP?

- a) 0,25 μm
- b) 0,5 μm
- c) 1 μm
- d) 5 μm

4 Jaké parenterální přípravky s obsahem vitamínů jsou určeny a schváleny pro podání novorozencům?

- a) Vitalipid N infant
- b) Multibionta
- c) Cernevit
- d) Cerucal inj.

5 Jaký je obsah Na^+ v mmol/l v přípravku NaCl 5,85%?

- a) 1 000 mmol/l
- b) 1 700 mmol/l
- c) 406 mmol/l
- d) není přítomen

6 Který z následujících postupů NENÍ vhodný u „plenkové dermatitidy“?

- a) postižené zvlhlé místo po šetrném očištění nechat volně zaschnout
- b) ma místo vlhké zapáčky ihned aplikovat pudr
- c) zabránit tření postižených ploch po omytí
- d) na očištěnou a zaschlou pokožku aplikovat ochranný krém s protizánětlivým účinkem

7 Lokálně aplikované kortikosteroidy se u atopické dermatitidy používají:

- a) dlouhodobě v chronickém stadiu
- b) kdykoliv a v jakémkoliv množství ke zlepšení stávajícího stavu
- c) pouze krátkodobě ke zvládnutí akutních příznaků onemocnění
- d) u této diagnózy se nepoužívají

8 V rámci ochrany před slunečním zářením můžeme u dětí od 6 měs. do 3 let používat:

- a) fyzikální „sunscreeny“
- b) libovolné vodotěsné ochranné krémy s vysokým ochranným faktorem
- c) není doporučeno používat žádnou „opalovací“ kosmetiku
- d) pouze mechanickou bariéru ve formě lehkého oděvu, kšiltovky, slunečníku apod.

9 Inhibitory α -amylázy podávané spolu s jídlem způsobují:

- a) nárůst obsahu glukózy v krvi
- b) snížení hladiny cholesterolu v krvi
- c) zpomalení štěpení polysacharidů v trávicím traktu
- d) zpomalení produkce α -amylázy ve slinných žlázách

10 Nojirmycin a 1-deoxynojirmycin jsou:

- a) látky urychlující trávení polysacharidů
- b) látky pocházející z bource morušového
- c) širokospektrá penicilinová antibiotika
- d) látky inhibující α -glukosidázu

11 Benzodiazepinová hypnotika:

- a) ovlivňují pouze benzodiazepinový receptor subtyp 1 (BZD1)
- b) mají nepříznivý vliv na architekturu spánku
- c) jsou vhodné zejména k léčbě nespavosti u starších pacientů
- d) při jejich podávání nehrozí riziko vzniku lékové závislosti

12 Halucinatorní syndrom se zrakovými a sluchovými iluzemi se objevuje po podání:

- a) diazepamu
- b) zopiclonu
- c) zolpidemu
- d) midazolamu

Správné odpovědi: 1. b; 2. a; 3. d; 4. a; 5. a; 6. b; 7. c; 8. a; 9. c; 10. d; 11. b; 12. c