

Vážení čtenáři, vzhledem k tomu, že jste kvůli spojení čísel 4–5 přišli o možnost získat body ČLnK za 1 z testů, připravili jsme pro Vás v posledním letošním čísle testy dva. Odpovědi na otázky v testu č. 6 najdete ve člancích ze všech čísel Praktického lékárenství tohoto roku. Za správné zodpovězení tohoto testu můžete získat **4 body při správnosti nad 90 % a 2 body při 90–75 %**. Odpovědi vyplňujte do **31. ledna 2014**, poté budou testy z tohoto čísla uzavřeny.

1 V léčbě akné

- a) efekt nastupuje po několika dnech
- b) doporučujeme kombinaci lokálních a celkových antibiotik
- c) retinoidy jsou vhodné na nezánettivé i zánětlivé projevy
- d) nesmíme využít hormonální přípravky

2 Retinoidy

- a) zvyšují citlivost kůže na UV záření
- b) běžně používáme u dětí a těhotných žen
- c) používáme v celkové léčbě akné maximálně 12 měsíců
- d) nikdy v lokální léčbě nekombinujeme s dalšími lokálně podávanými léčivými

3 Léčivé rostliny s adaptogenními účinky

- a) zvyšují nespecifickou odolnost vůči nepříznivým vlivům vnějšího prostředí
- b) jsou využívány jako antimalarika
- c) mají hepatoprotektivní účinky
- d) zmírňují některé negativní procesy stárnutí

4 Mezi nefarmakologické postupy v terapii deprese patří

- a) fototerapie, elektrokonvulzivní terapie, psychoterapie
- b) spánková deprivace, vagová stimulace
- c) repetitivní transkraniální magnetická stimulace
- d) všechny uvedené postupy

5 Dávkování retigabinu

- a) retigabin se podává v udržovací dávce 600–1 200 mg, v jedné denní dávce
- b) retigabin se podává v udržovací dávce 150–300 mg, rozdělené do tří denních dávek
- c) retigabin se podává v udržovací dávce 600–1 200 mg, rozdělené do tří denních dávek
- d) retigabin se podává v udržovací dávce 300–600 mg, rozdělené do dvou denních dávek

6 Nejnakazlivější fází oparu je

- a) fáze první, tzv. prodromální (pálení, brnění)
- b) fáze druhá (zarudnutí, tvorba puchýřků)
- c) fáze třetí (prasknutí puchýřků, mokvavý vřidek)
- d) fáze čtvrtá (zasychání ranky, tvorba strupu)

7 Při léčbě oparu rtu jsou antivirotika v lokální formě nejúčinnější ve fázi

- a) první
- b) druhé
- c) třetí
- d) čtvrté

8 Při infekcích močových cest lze podat

- a) ribózu
- b) dextrózu
- c) D-manózu
- d) L-manózu

9 Co rozumíme pod pojmem soběstačnost?

- a) schopnost žít samostatně
- b) schopnost vykonávat ADL a IADL
- c) normální výsledek MMSE
- d) schopnost orientovat se v běžném prostředí

10 Která doporučení/kritéria jsou pro klinickou praxi v České republice nejužitečnější pro identifikaci preskripce nevhodné ve stáří?

- a) STOPP kritéria
- b) Beersova kritéria
- c) STOPP a START kritéria
- d) START kritéria

11 Maximální denní dávka paracetamolu je u zdravého dospělého člověka vážícího 85 kg

- a) 1 g
- b) 2 g
- c) 4 g
- d) není stanovena

12 Rifampicin je

- a) dnes již nepoužívané antituberkulotikum
- b) silný induktor enzymů cytochromu P450
- c) kontraindikován při terapii tuberkulózy
- d) kontraindikován v kombinaci s antituberkulotikem isoniazidem

13 Hepatotoxicita nimesulidu se projevuje

- a) zvýšeným výskytem jaterních adenomů
- b) steatózou
- c) akutní hepatitidou, nekrózou hepatocytů, event. kombinací obou forem
- d) reaktivací latentní hepatitidy B

14 Vyberte druh jetele, který je nejvýznamnějším zdrojem fytoestrogenů:

- a) *Trifolium repens*
- b) *Trifolium resupinatum*
- c) *Trifolium pallidum*
- d) *Trifolium pratense*

15 **Fytoestrogenní účinek jetele lučního podmiňují především**

- a) fenolické glykosidy
- b) izoflavonoidy
- c) třísloviny
- d) kumariny

16 **Mezi nejúčinnější fytoestrogeny jetele lučního patří**

- a) genistein
- b) apigenin
- c) daidzein
- d) kvercetin

17 **Výlučnou (exkluzivní) enterální výživu používáme u dětí při léčbě**

- a) Crohnovy choroby
- b) ulcerózní kolitidy
- c) celiakie
- d) akutní gastritidy

18 **U dětí využíváme nejčastěji enterální výživu**

- a) oligomerní
- b) polymerní
- c) s přidavkem bílkovin
- d) s přidavkem sacharidů

19 **Mezi kontraindikace parenterální výživy patří**

- a) akutní pankreatitida
- b) střevní neprůchodnost
- c) hypoglykemie
- d) parenterální výživa nemá zásadní kontraindikace

20 **Pro stanovení diagnózy polékového exantému je nejdůležitější**

- a) klinický obraz
- b) podrobná znalost anamnézy
- c) kožní testy
- d) laboratorní vyšetření