

Vážení čtenáři, na stránkách Praktického lékařství se v každém čísle setkáváte s autodidaktickým testem, který ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Jistě Vás potěší, že za správné zodpovězení otázek můžete získat body do kontinuálního vzdělávání ČLnK. Bodové ohodnocení každého testu je stanovováno redakční radou časopisu individuálně dle jeho náročnosti. Za správné zodpovězení tohoto testu můžete získat **4 body při správnosti nad 90 % a 2 body při 90–75 %**. Podmínkou přístupu na autodidaktické testy je zakoupení předplatného na rok 2014. Všichni předplatitelé si navíc musí znovu zažádat o potvrzení výhod, které se vždy udělují na daný kalendářní rok. Návod ke zpřístupnění autodidaktických testů i archivu článků naleznete na [www.praktickelekarenstvi.cz](http://www.praktickelekarenstvi.cz). Test se skládá ze 20 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď. Odpovědi na otázky jsou v souladu s informacemi v příslušných článcích, řešení najdete v příštím čísle. Odpovědi vyplňte do **20. listopadu 2014**, poté bude test z tohoto čísla uzavřen.

**1** Rezistenci na léčbu klopido-grelem nacházíme přibližně až u:

- a) 2 % pacientů
- b) 5–10 % pacientů
- c) 20 % pacientů
- d) 30 % pacientů

**2** Nejčastějším nežádoucím účinkem prasugrelu je:

- a) krvácení
- b) dušnost
- c) vzestup jaterních enzymů
- d) alergická reakce

**3** K nejčastějším nežádoucím účinkům tikagreloru patří:

- a) oční krvácení
- b) srdeční arytmie
- c) dušnost
- d) vzestup jaterních enzymů

**4** Léčbou volby u prolaktinomu je:

- a) kabergolin
- b) transsfenoidální adenomektomie
- c) bromokriptin
- d) octreotid nebo jiné somatostatinové analogum

**5** Jediným v současnosti schváleným léčivem pro léčbu Cushingova syndromu v ČR je:

- a) ketokonazol
- b) kabergolin
- c) pasireotid
- d) somatuline autogel

**6** Jak se může farmaceut zapojit do managementu snižování kardiovaskulárního rizika?

- a) možností měření krevního tlaku v lékárně
- b) minimalizací rizik dlouhodobé terapie glukokortikoidy
- c) zařazením se do garantovaného kurzu „Odvykání kouření v lékárnách“
- d) stanovením diagnózy arteriální hypertenze

**7** Tricyklická antidepresiva mohou svými anticholinergními účinky způsobit:

- a) dilataci zornice
- b) retinopatii
- c) akutní glaukomový záchvat
- d) rozmazané vidění

**8** Při dlouhodobém užívání kortikoidů hrozí riziko vzniku:

- a) nitroočního krvácení
- b) katarakty
- c) pigmentových depozit v čočce
- d) glaukomu

**9** Co platí pro antimalarika?

- a) nejrizikovějšími léčivy jsou atovachon a hydroxychlorochin
- b) chlorochin je toxičtější než hydroxychlorochin
- c) chlorochin a hydroxychlorochin vytváří depozita v rohovce
- d) chlorochin a hydroxychlorochin fototoxicky poškozuji spojivku

**10** Syndrom suchého oka způsobují nebo zhoršují tyto skupiny léčiv:

- a) retinoidy
- b) digoxin
- c) inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu
- d) betablokátory

**11** Zvolte správné tvrzení N-acetylcysteinu:

- a) snižuje účinky paracetamolu
- b) zvyšuje účinky paracetamolu
- c) je využíván při otravě dioxiny
- d) působí proti působení NAPQI

**12** N-acetylcystein může být využit při:

- a) otravě houbami
- b) profylaxi urotoxicity při léčbě cytostatiky
- c) chronickém a dráždivém kašli
- d) při otravě alkoholem

**13** Zvolte správné tvrzení o N-acetylcysteinu:

- a) v bronchoalveolární laváži zvyšuje koncentraci laktoferinu
- b) potlačuje tvorbu IL-6
- c) snižuje aktivitu NK-buněk
- d) zvyšuje tvorbu TNF-alfa

**14** Které léčivé přípravky mohou být v rámci klinického hodnocení léčiv dodávány zadavatelem přímo do centra příslušného klinického hodnocení?

- a) medicínální plyny, infuzní roztoky, očkovací látky
- b) medicínální plyny, infuzní roztoky, očkovací látky, radiofarmaka, cytostatika
- c) infuzní roztoky, očkovací látky, radiofarmaka, cytostatika, léčivé přípravky pro genovou terapii

- d) medicínální plyny, infuzní roztoky, očkovací látky, radiofarmaka

**15 Která nefarmakologická opatření jsou zásadní v kardiovaskulární prevenci?**

- a) zanechání kouření, pohybová aktivita, dostatečný pitný režim
- b) zanechání kouření, pohybová aktivita, pestrá strava obohacená o trans nenasycené mastné kyseliny
- c) zanechání kouření, pohybová aktivita, redukce hmotnosti, snížení krevního tlaku vhodnou volbou antihypertenziv
- d) zanechání kouření, redukce hmotnosti, redukce příjmu alkoholu

**16 Hodnocené léčivé přípravky jsou v lékárně uchovávány:**

- a) samostatně, odděleně od ostatních léčivých přípravků, za skladování zodpovídá studijní koordinátor
- b) samostatně, odděleně od ostatních léčivých přípravků, za skladování zodpovídá monitor klinického hodnocení
- c) společně s ostatními léčivými přípravky, za skladování zodpovídá vedoucí lékárny
- d) samostatně, odděleně od ostatních léčivých přípravků, za skladování zodpovídá zkoušejícím pověřený farmaceut nebo farmaceutický asistent

**17 Vyberte správné tvrzení o způsobu označování hodnocených léčivých přípravků:**

- a) V souladu se správnou klinickou praxí musí být označeny pouze hodnocené léčivé přípravky připravované v lékárně.

- b) V souladu se správnou lékárenskou praxí musí být označeny pouze hodnocené léčivé přípravky připravované v lékárně.
- c) V souladu se správnou klinickou praxí musí být označeny hodnocené léčivé přípravky, označení provádí zadavatel, v případě potřeby farmaceut.
- d) V souladu se správnou klinickou praxí musí být označeny hodnocené léčivé přípravky, označení provádí pouze farmaceut.

**18 Doporučená denní dávka zázvorového extraktu u těhotenské nauzey je:**

- a) 1 g
- b) 4–6 g
- c) 0,1–0,2 g
- d) 2–4 g

**19 Mezi hlavní projevy při dlouhodobém předávkování lékořící patří:**

- a) zmatenost a halucinace, poruchy CNS
- b) hypertenze, otoky, hypokalemie
- c) nauzea, zvracení, vznik žaludečních vředů
- d) bolesti svalů a kloubů

**20 Konzumace sóji se nedoporučuje:**

- a) při klimakteriu
- b) pacientům s laktózovou intolerancí
- c) pacientům s hormonálními poruchami
- d) při problémech s prostatou

Správné odpovědi z testu číslo 4 / 2014: 1. a, d; 2. c, d; 3. a, b, d; 4. a, b, d; 5. a, b; 6. b; 7. b; 8. c; 9. c; 10. b; 11. a; 12. c; 13. d; 14. b; 15. a, b; 16. a; 17. b; 18. c; 19. d; 20. a