

Kvíz č. 5

1 | Vůči jakým genotypově odlišným papillomavirovým nákazám chrání obě komerční vakcíny?

- a) HPV typ 6 a 11
- b) HPV typ 6, 11, 16 a 18
- c) HPV typ 16 a 18
- d) HPV typ 11 a 18

2 | Mezi indikace inhibitorů ACE nepatří:

- a) akutní srdeční infarkt
- b) srdeční selhání
- c) diabetická nefropatie
- d) hypertenze v těhotenství

3 | V metabolismu kostní tkáně se přímo uplatňuje:

- a) vitamin A
- b) vitamin D
- c) vitamin E
- d) vitamin K

4 | Jaká je délka doby ochrany po HPV očkování?

- a) protektivní protilátky přetrvávají po očkování maximálně po dobu 5 let
- b) očkování chrání po dobu 3 let, pak dochází ke ztrátě neutralizačních protilátek
- c) ochrana očkováním se nezná, ale předpokládá se celoživotní
- d) klinická účinnost přetrvává minimálně 5 let, předpokládá se delší až 10-15 let

5 | Revmatoidní artritida je:

- a) systémové onemocnění
- b) progredující a invalidizující onemocnění
- c) nejčastější zánětlivé revmatické onemocnění
- d) systémové onemocnění + nejčastější zánětlivé revmatické onemocnění

6 | Podávání vitaminu K nemá význam:

- a) při nedostatečném osídlení střevní sliznice bakteriemi
- b) při cystické fibróze
- c) při koagulopatii v důsledku poškození jaterních buněk
- d) při malabsorpci tuků

7 | Areální alopcie je:

- a) difuzní padání vlasů
- b) hormonálně podmíněné padání vlasů u mužů
- c) ložiskové vypadávání vlasů
- d) hormonálně podmíněné padání vlasů u žen

8 | Revmatoidní artritida může začínat jako:

- a) symetrická polyartritida
- b) monoartritida
- c) nespecifické příznaky
- d) symetrická polyartritida + nespecifické příznaky

9 | K léčbě vlasových obtíží lze doporučit:

- a) vitaminy řady B
- b) vitaminy řady A
- c) antibiotika
- d) minerály (Zn, Mg, Se), aminokyseliny s obsahem síry

10 | Mezi nežádoucí účinky inhibitorů ACE patří:

- a) suchý kašel
- b) porucha jaterní funkcí
- c) angioneurotický edém
- d) zhoršení kognitivních funkcí po mozkové příhodě

11 | Příznaky, které by měly vést k podezření na počínající revmatoidní artritidu, jsou:

- a) traumatická artritida
- b) oteklé klouby především metakarpofalangeální
- c) dlouhá ranní ztuhlost
- d) traumatická artritida + dlouhá ranní ztuhlost + oteklé klouby především metakarpofalangeální

12 | Vypadávání vlasů mohou vyvolat:

- a) některé léky (cytostatika, retinoidy, ACE inhibitory, antikoagulační, betablokátory)
- b) některé endokrinní poruchy (postihující štítnou žlázu, příštítná tělíska, podvěsek mozkový)
- c) některé závažné infekce (horečnaté virózy, streptokokové infekce, HIV infekce)
- d) těžká dlouhodobá psychická zátěž

Řešení: 1 c / 2 d / 3 a, b, d / 4 d / 5 d / 6 c / 7 c / 8 d / 9 a, d / 10 a, c / 11 d / 12 a, b, c, d

