

Vážení čtenáři, na stránkách Praktického lékárenství se v každém čísle setkáváte s autodidaktickým testem, který ověří, jak pečlivě jste přečetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete na jeho konci. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

**1 Diagnostiku dráždivého tračníku charakterizuje:**

- a) potíže trvající bez přerušení posledních 6 měsíců
- b) potíže se projevují v průběhu minimálně 12 týdnů a jejich vznik musí být nejméně 6 měsíců před stanovením diagnózy
- c) potíže přetrvávající min. 6 měsíců po vyléčení organického onemocnění
- d) potíže objevující se denně bez prokázaného organického původu

**2 Pokud v terapii dráždivého tračníku není u pacientů efektivní nefarmakologický přístup, pak:**

- a) opakujeme morfologické vyšetření a pak indikujeme farmakoterapii
- b) po vyloučení organického postižení začínáme v terapii vždy kombinací nefarmakologického přístupu, ale i farmakoterapií
- c) pokračujeme v nefarmakologickém doporučení, nicméně zahájíme podávání psychofarmak v minimální dávce a symptomatickou terapii dle převažujícího symptomu
- d) pokračujeme v nefarmakologickém doporučení a zahájíme symptomatickou terapii dle převažujícího příznaku

**3 Uveďte, které z uvedených léků je možno off-label podat subkutánně a jsou takto užívány ve specializované paliativní péči:**

- a) metoclopramid
- b) tiaprid
- c) haloperidol
- d) metamizol

**4 Uveďte, která tvrzení o morfinu hydrochloridu při jeho užití ve specializované paliativní péči jsou pravdivá:**

- a) je lékem k léčbě bolesti, dušnosti a sedaci nemocného v terminální fázi
- b) je lékem k léčbě dušnosti a bolesti u pokročile onkologicky nemocných
- c) je silným opioidem, který je s efektem minimálně stejným jako při i. m. podání nutné podávat subkutánně, i. m. podání je u nemocných v paliativní péči non-lege artis
- d) ekonomizuje dýchání a při správné indikaci a titraci nedochází k útlumu dýchacího centra a nežádoucí účinky jsou minimalizovány

**5 Při zvýšení hladiny cholesterolu je lékem první volby:**

- a) fibrát
- b) pryskyřice
- c) statin
- d) niacin

**6 Při léčbě statiny není, pro vyšší pravděpodobnost lékové interakce, vhodné používat při protiinfekční léčbě antibiotika ze skupiny:**

- a) penicilinů
- b) aminoglykosidů
- c) cefalosporinů
- d) makrolidů

**7 K léčbě slizniční kandidózy se nehodí:**

- a) topické formulace imidazolových antimykotik
- b) perorální flukonazol
- c) griseofulvin
- d) topické formulace polyenových antibiotik

**8 Mezi širokospektrá antimykotika vhodná k léčbě kožních mykóz patří:**

- a) Flukonazol
- b) Griseofulvin
- c) Terbinafin
- d) Bifonazol

**9 Kůže na ruce je zranitelnější než kůže na ostatních částech těla, protože:**

- a) kůže rukou je tenká
- b) kůže rukou má nižší počet mazových žláz
- c) kůže rukou je častěji vystavována nepříznivým vlivům
- d) všechny odpovědi jsou správně

**10 Pro zlepšení kvality kůže rukou:**

- a) co nejvíce ruce myjeme, nejlépe v horké vodě
- b) vyvarujeme se používání ochranných rukavic
- c) minimálně na ruce aplikujeme ošetřující krémy
- d) ani jedna odpověď není správná

**11 Zázvor je rostlina, která se množí:**

- a) semeny
- b) jen vegetativně
- c) semeny a řízků oddenků
- d) žádná z předchozích odpovědí není správná

**12 Používání zázvoru je kontraindikováno:**

- a) při bolestech hlavy
- b) u pacientů se žlučovými kameny
- c) u pacientů užívajících antikoagulanty a nesteroidní antiflogistika
- d) u astmatiků

Správné odpovědi: 1. b; 2. d; 3. a, b, c; 4. b, c, d; 5. c; 6. d; 7. c; 8. a, c; 9. d; 10. d; 11. b; 12. b, c