

Vážení čtenáři, na stránkách Praktického lékařství se v každém čísle setkáváte s autodidaktickým testem, který ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete na jeho konci. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Lékem první volby v terapii fokálních záchvatů v ČR je:

- a) vigabatrin
- b) karbamazepin
- c) tiagabin
- d) klonazepam

2 Mezi širokospektrá nová antiepileptika nepatří:

- a) lamotigin
- b) rufunamid
- c) levetiracetam
- d) tiagabin

3 Jód je kontraindikován u:

- a) těhotných a kojících
- b) alergických
- c) imunodeficientních
- d) pacientů s poruchou funkce štítné žlázy

4 Hlavními nevýhodami chlorhexidinu jsou:

- a) vysoká cena
- b) riziko vzniku alergií
- c) hořká chuť
- d) možnost hnědnutí zubní skloviny

5 Před mykologickým vyšetřením se nehty nesmí ošetřovat:

- a) 1–2 týdny
- b) 2–3 týdny
- c) 3–4 týdny
- d) 5–6 týdnů

6 Nejčastější formou onychomykózy (OM) je:

- a) distální a laterální subungualní OM
- b) proximální subungualní OM
- c) superficiální OM
- d) totalní dystrofická OM

7 Nedoslýchavost:

- a) není příznakem onemocnění převodního aparátu – zevního zvukovodu, bubínku, středního ucha nebo sluchové trubice
- b) je příznakem onemocnění vnitřního ucha
- c) nikdy nedoprovází příznak závratí, zvracení
- d) může být přechodná a po vyléčení onemocnění sluchového orgánu má jedinec normální práh sluchu, nebo je naopak stavem trvalým

8 Léčba nedoslýchavosti:

- a) záleží na místě postižení sluchového analyzátoru, kde onemocnění vzniklo, nezáleží na příčině, která ji vyvolala, ani na délce a intenzitě, se kterou působila
- b) náhle vzniklé mívá většinou prognózu tím lepší, čím dříve je intenzivní léčba zahájena
- c) percepční kochleární spočívá v podávání antihistaminik, které zlepšují mikrocirkulaci v labyrintu, kortikoidů, které působí protizánětlivě, antiedematózně a antiproliferativně, piracetamu nebo pentoxifylinu, které ovlivňují krevní viskozitu a tuto léčbu kombinovat s léčbou přetlakem kyslíku
- d) Není pravda, že preparáty s Ginkgo biloba snižují tvorbu volných kyslíkových radikálů, stimulují prostacyklin a endothelium derived relaxing faktor (EDRF), a reagují s nervovými přenašeči, ani že se neuplatňují v léčbě nedoslýchavosti

9 U kterých imunosupresivních léčiv je nutné dodržet denní dobu podání v souladu s cirkadiánním rytmem?

- a) cyklosporin
- b) mykofenolát mofetil
- c) prednison
- d) sirolimus

10 Která kombinace léčiv se manifestuje jako závažná farmakokinetická interakce, která může vést k útlumu kostní dřeně a vzniku život ohrožující pancytopenie?

- a) azathioprin x allopurinol
- b) sirolimus x cyklosporin
- c) takrolimus x flukonazol
- d) cyklosporin x amiodaron

11 Na vzniku kožních projevů atopického ekzému se podílí:

- a) genetická dispozice
- b) imunologická dysbalance
- c) vliv faktorů zevního prostředí
- d) porucha funkce kožní bariéry

12 Lokální imunomodulátory při atopické dermatitidě:

- a) jsou účinnější než zevně aplikované kortikosteroidy
- b) mohou se kombinovat s kortikoidními externy
- c) se neaplikují do 2 let věku
- d) paracetamol perorálně může redukovat jejich event. přechodné pálení

Správné odpovědi: 1. b 2. b, d 3. a, b, d 4. c, d 5. d 6. a 7. b, d 8. b, d 9. c 10. a 11. a, b, c, d 12. b, c, d