

Vážení čtenáři, na stránkách Praktického lékařství se v každém čísle setkáváte s autodidaktickým testem, který ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Jistě Vás potěší, že za správné zodpovězení otázek nově můžete získat body ČLnK (3 body při 75–90% úspěšnosti, 5 bodů při 90% správných odpovědích). Přístup na testy je umožněn pouze předplatitelům přes www.praktickelekarenstvi.cz, najdete ho vpravo v menu časopisu spolu s dalšími organizačními instrukcemi. Test se skládá ze 20 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď. Odpovědi na otázky jsou v souladu s informacemi v příslušných článcích, řešení najdete v příštím čísle. Odpovědi vyplňujte do 23. ledna, poté bude test z tohoto čísla uzavřen.

1 Nadprodukce kyseliny močové se uplatňuje u:

- a) 90% pacientů s hyperurikemií
- b) všech pacientů s hyperurikemií
- c) 10% pacientů s hyperurikemií
- d) pouze u pacientů mužského pohlaví

2 Akutní dnávrá artritida je obvykle:

- a) polyartikulární
- b) oligoartikulární
- c) monoartikulární
- d) postihuje symetricky drobné klouby rukou

3 Cílovou hodnotou urikemie u dny je podle nových Doporučení Evropské ligy proti revmatizmu hodnota:

- a) 360 $\mu\text{mol/l}$
- b) 380 $\mu\text{mol/l}$
- c) 420 $\mu\text{mol/l}$
- d) 460 $\mu\text{mol/l}$

4 Doporučená iniciační dávka febuxostatu v léčbě hyperurikemie je:

- a) 40 mg/den
- b) 120 mg/den
- c) 80 mg/den
- d) 240 mg/den

5 Disulfiram působí:

- a) snížení účinku alkoholu
- b) reverzibilní inhibici enzymu alkoholdehydrogenázy
- c) irreverzibilní inhibici enzymu aldehyddehydrogenázy
- d) v kombinaci s alkoholem nepříjemné kardiiovaskulární účinky a zvracení

6 Acamprosát:

- a) působí antagonisticky na GABA-receptory
- b) má obdobnou strukturu jako aminokyselina glutamát
- c) podává se ve 3denních dávkách
- d) alkohol výrazně zvyšuje plazmatické hladiny acamprosatu

7 Jako pomocná léčiva se při terapii abúzu alkoholu používají:

- a) emetin
- b) inhibitory zpětného vychytávání serotoninu
- c) gabapentin
- d) apomorfín

8 Závažnou anafylaktoidní reakci může vzácně vyvolat:

- a) indometacin

- b) metamizol
- c) paracetamol
- d) naproxen

9 Doporučovaná aplikační cesta NSA je:

- a) perorální
- b) intravenózní
- c) subkutánní
- d) intramuskulární

10 Kde je lokalizován otok v případě subglotické laryngitidy?

- a) v celém hrtanu
- b) pouze v oblasti hlasivek
- c) hlavně pod hlasivkami v subglotickém prostoru
- d) onemocnění je bez otoku

11 Hlavní příčina snížené incidence supraglotické laryngitidy je:

- a) včasné nasazení antibiotik
- b) očkování proti Haemophilus influenzae typu B
- c) změna vyvolávající příčiny
- d) intravenózní aplikace kortikoidů

12 Základní léčba úvodní fáze středoušního zánětu zahrnuje:

- a) podání analgetik, antipyretik, chladivé obklady na ucho
- b) antibiotickou terapii
- c) provedení paracentézy
- d) nemusíme léčit

13 Skupina novorozenců je charakterizována:

- a) věkem do 3 měsíců
- b) možností podání léčivých přípravků s konzervačními přísadami
- c) rizikem nekrózy GIT po perorálním podání hyperosmotických roztoků
- d) odlišným metabolismem a clearance léčiva

14 Čípky připravované v lékárně:

- a) jsou vhodnou lékovou formou pro většinu účinných látek používaných v pediatrii
- b) dávka účinné látky odpovídá dávce perorální
- c) doporučená doba použitelnosti dle pokynu SÚKL je 6 měsíců
- d) jsou výhodné u dětí s poruchou perorálního příjmu potravy a u nespolupracujících dětí

15 Želatinové tobolky připravované v lékárně:

- a) je nutno zpravidla dětem do 6 let vysypávat do stravy nebo nápoje
- b) obsahují pomocné látky nevhodné pro děti do 1 roku
- c) patří mezi méně stabilní lékové formy z hlediska fyzikálně-chemických vlastností
- d) lze připravovat pouze ze suroviny v lékopisné kvalitě

16 Při přípravě tobolek lze rozdrtit následující HVLP:

- a) Digoxin tbl.
- b) Ortanol cps.
- c) Trimepranol tbl.
- d) Euphyllin CR cps

17 K lékopisným surovinám pro drogu *Liquiritiae radix* nepatří:

- a) *Glycyrrhiza uralensis*
- b) *Glycyrrhiza echinata*
- c) *Glycyrrhiza glabra*
- d) *Glycyrrhiza inflata*

18 Pokud je lékořice užívána jako ochucovadlo, je povolena maximální denní dávka:

- a) 100 mg
- b) 200 mg
- c) 250 mg
- d) 500 mg

19 Doporučení dávkování u lékořice je:

- a) 5–12 g/denně sušeného kořene
- b) 3–12 g/denně sušeného kořene
- c) 3–15 g/denně sušeného kořene
- d) 1,5–6 ml denně lékořicového extraktu

20 Lékořice (*Liquiritiae radix*) neinteraguje s:

- a) laxativy
- b) digoxinem
- c) sedativy
- d) antihypertenzivy

Správné odpovědi testu číslo 5 / 2011: 1. d; 2. c; 3. b; 4. b, c; 5. b, d; 6. d; 7. b; 8. b, d; 9. d; 10. a; 11. a, b, c; 12. c, d; 13. b; 14. a; 15. c; 16. a; 17. b; 18. b, c, d; 19. b; 20. a, b