

KOMENTÁŘ K ČLÁNKU

Prakt. lékař. 2018; 14(2): 52–54

Stručný přehled farmakologických možností léčby bolesti u dětí

MUDr. Petra Matalová, Ph.D.

Ústav farmakologie, FN Olomouc

V závěru článku je zmíněna možnost místního znecitlivění pomocí přípravku EMLA. Vzhledem k omezení rozsahu článku nebyla tato problematika dále rozebírána. Proto se autoři rozhodli pro doplnění předchozího sdělení.

Od roku 2013 je možné připravit magistraliter lidokainový emulgel (1, 2), který vykazuje shodné anestetické vlastnosti jako průmyslově vyráběný přípravek EMLA krém. Z ekonomických důvodů tak může být pro některá pracoviště tento magistraliter přípravek dostupnější (2). Od května 2018 je

navíc k dispozici pro magistraliter přípravu léčivo prilokain (3), a tak je teoreticky možné připravit alternativu EMLA ve shodném složení účinných látek. Oproti přípravku od autorů (2) však bude finančně nákladnější, ale předpokládá se, že stále levnější než komerčně vyráběný krém EMLA.

LITERATURA

1. Sklenář Z, Horáčková K. Nové léčivé látky v magistraliter receptuře X – Lidokain a lidokain-hydrochlorid. Prakt. Lékař. 2011; 7(5): 232–235.
2. Sklenář Z, Horáčková K, Bakhouche H, Slanař O. Lidokainový gel pro použití na kůži magistraliter připravený. Čes. slov. Farm. 2012; 61(4): 163–168.
3. Sklenář Z. Osobní sdělení. 2018.