

**Tab. 3.** Typy polékové intersticiální pneumonie a související léčiva (12, 16)

Typy polékové intersticiální pneumonie	Související léčiva
Akutní intersticiální pneumonie/difuzní alveolární poškození (AIP/DAD)	amiodaron, cyclofosfamid, gefitinib, erlotinib, cetuximab, panitumumab, methotrexát aj.
Organizující se pneumonie/obliterující bronchiolitida s organizující se pneumonií (OP/BOOP)	bleomycin, methotrexát, cyclofosfamid, soli zlata, amiodaron, sulfasalazin, penicillamin aj.
Nespecifická intersticiální pneumonie (NSIP)	amiodaron, methotrexát, penicillamin, soli zlata, hydralazin
Hypersenzitivní pneumonie (HP)	gefitinib aj.

Tab. 4. Léčiva, která způsobují kardiální edém plic (12)

1. alfa-mimetika (adrenalin, noradrenalin, fenylefrin aj.)
2. beta-blokátory (propranolol, metoprolol, atenolol aj.)
3. kalciové blokátory (verapamil, diltiazem, nifedipin)
4. náhrady plasmy (albumin aj.)
5. kortikoidní hormony

EP jsou radiologicky patrné pruhovité okrsky plicních konsolidací společně s opacitami mléčného skla. Léky indukující EP jsou uvedeny v tabulce 7.

Postížení dýchacích cest

Léky indukované astma nebo bronchospasmus můžeme obecně rozdělit do tří typů podle vyvolávající příčiny: (a) astmatické ataky indukované beta-blokátory, (b) astmatické záchvaty indukované NSAID, které vznikají například při aspirinem indukovaném astmatu a (c) astmatické záchvaty vyvolané inhalací řady substancí, které mohou vyvolat astma jako choroby z povolání (12).

Tab. 5. Léčiva, která způsobují nekardiální edém plic (12, 16)

1. cytostatika (cytarabin, gemcitabin, interleukin-2, mitomycin, pentostatin, tretinoin, arsen trioxid, vinblastin)
2. imunosupresiva (methotrexát, muromonab)
3. antimykotika (amphotericin B)
4. léčiva v pneumologii (epoprostenol, oxid dusnatý)
5. diuretika (acetazolamid, hydrochlorothiazid)
6. psychofarmaka (tricyklická antidepresiva, fenothiaziny)
7. analgetika (acetylsalicylová kyselina, morfin)
8. kontrastní látky
9. ostatní (oxytocin, protamin, narkotika-heroin, paraquat)

Plicní cévní léze

Tromboembolická plicní nemoc (TEN)

Estrogenní přípravky a perorální antikoncepce podporují koagulaci krve, proto je jejich použití považováno za rizikový faktor pro vznik TEN.