



Léčba neuropatické bolesti

Marek Hakl

Klinika algeziologie a preventivní péče, Medicinecare, s.r.o., Brno
Chirurgická klinika FN Brno a LF MU

Neuropatická bolest patří mezi jedny z nejhůře léčitelných bolestivých stavů. Řada běžných analgetik je v její léčbě neúčinná. V terapii do popředí vstupují především léky ze skupin antikonvulziv, antidepresiv, opioidů se zvýšenou afinitou k neuropatické bolesti a poslední dobou i nové topické formy léčiv. Výskyt neuropatické bolesti se exponenciálně zvyšuje s věkem pacientů, zároveň se však i snižuje tolerance pacientů k antineuropatické léčbě. Velkým přínosem v léčbě neuropatické bolesti bylo vytvoření jednotných doporučených postupů EFNS, ze kterých následně vychází doporučení národní. Mezi nejčastější formy neuropatické bolesti patří polyneuropatie, neuralgie trojklaného nervu, postherpetické neuralgie, případně centrální neurogenní bolesti.

Klíčová slova: neuropatická bolest, antikonvulziva, opioidy, doporučené postupy.

Neuropathic pain treatment

Neuropathic pain is one of the most difficult pain condition to treat. Many common analgesics are ineffective in treating it. In therapy to the forefront are coming above all mainly a group of drugs from anticonvulsants, anti depressives, opioids with increased affinity to neuropathic pain and lately new topical form of medicaments. Occurrence of the neuropathic pain is increasing exponentially with the age of the patients, and at the same time the tolerance of the patients to anti neuropathic treatment is decreasing. Major benefit to treatment of the neuropathic

KORESPONDENČNÍ ADRESA AUTORA: MUDr. Marek Hakl, Ph.D., marek.hakl@volny.cz
Klinika algeziologie a preventivní péče, Medicinecare, s.r.o.
Dělnická 53, 624 00 Brno

Převzato z: Med. praxi 2019; 16(3): 148–152
Článek přijat redakcí: 5. 2. 2019
Článek přijat k publikaci: 11. 3. 2019