

Tab. 2. Charakteristika injekčních DMD léčiv – dle (5) a SPC jednotlivých léků (21–25)

Účinná látka	Obchodní název	Farmakologická skupina	Linie léčby ×	Léková forma, balení	Obvyklé dávkování, způsob podání	Uchovávání	Nežádoucí účinky, lékové interakce
interferon (IFN) beta-1a	Avonex	rekombinantní interferon beta	CIS, 1.	4 × 0,5 ml/30 µg – inj. roztok v předplň. stříkačce/peru	30 µg i. m. 1× týdně	2–8 °C; jednorázově až 7 dnů při 15–30 °C	NÚ: Nejčastěji flu-like syndrom (trvání hodiny až den, lze mírnit NSAID, paracetamolem). Po aplikaci se mohou objevit přechodně symptomy podobné RS, epizody hypertonie a/nebo těžké svalové ochablosti. Méně obvyklé NÚ: průjem, anorexie, zvracení, insomnie, závratě, úzkost, vyrážka, vazodilatace, palpitace. Podávání IFN vzácně dáváno do souvislosti s vážnými CNS NÚ (deprese, sebevraždy apod.). Může se objevit hypersenzitivní reakce, IJT, leuko/trombocytopenie (obvykle mírné a reverzibilní). Management lokálních reakcí: chlazení místa vpichu při IM inj., lokálně KS, kontrola inj. techniky. Lékové interakce PK: nepravděpodobné, PD: akcentace společných NÚ. CAVE: živé vakcíny.
	Rebif			12 × 22 µg nebo 44 µg (předplň. inj. stříkačka); 4 × 1,5 ml inj. roztok v zás. vložce (konc. 22 nebo 44 µg/0,5 ml)	22–44 µg s. c. 3× týdně	2–8 °C; jednorázově až 14 dnů při 15–25 °C. Nepoužité v pův. obalu lze poté vrátit k uchov. do chladničky	
interferon beta-1b	Betaferon	rekombinantní interferon beta	CIS, 1.	prášek + rozp. pro inj. roztok, 15 × 0,3 mg	250 µg s. c. obden	Do 25 °C; Po rekonstituci stabilní 3 hod. při 2–8 °C.	