

**Tab. 3.** Charakteristika infuzních DMD léčiv – dle (5) a SPC jednotlivých léků (26–28)

| Účinná látka | Obchodní název | Farmakologická skupina             | Linie léčby × | Léková forma, balení                    | Obvyklé dávkování, způsob podání                                                                                                              | Uchovávání | Nežádoucí účinky, lékové interakce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| alemtuzumab  | Lemtrada       | monoklonální protilátka, anti-CD52 | 1.*, ESK      | koncentrát pro infuzi; 1 × 12 mg/1,2 ml | Cyklus 1: 12 mg i. v. infuze, dny 1–5; za 12 měsíců potom cyklus 2: 12 mg i. v. infuze, dny 1–3 (možné ev. další 2 cykly). Kape cca 4 hodiny. | 2–8 °C     | Nejzávažnější NÚ: autoimunitní onemocnění (idiopatická trombocytopenická purpura, poruchy štítné žlázy, nefropatie, cytopenie), závažné reakce spojené s infuzí (pyrexie, kopřivka, fibrilace síní, nauzea, hrudní dyskomfort, hypotenze) a infekce (apendicitis, gastroenteritis, pneumonie, zubní infekce, virové infekce, příp. jejich reaktivace – VZV, HPV, PML, cytomegalovirové infekce, infekce virem Epstein-Barrové, tuberkulóza, listerióza). Nejčastější NÚ (≥ 20 %): vyrážka, bolest hlavy, pyrexie, infekce dýchacích cest. Vzácně závažné, někdy až fatální, neočekávané NÚ, většinou 1–3 dny po infuzi: cévní mozková příhoda, infarkt myokardu, plicní krvácení, arteriální disekce, perikarditida. <b>Lékové interakce</b> PK: nejsou popsány. PD: akcentace společných NÚ. CAVE: živé vakcíny. |